

**UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE**

Re: Application of: **HUBER et al.**  
Serial No.: To Be Assigned  
Filed: Herewith  
For: **METHOD FOR TWO DIMENSIONAL  
REPRESENTATION, INTERPOLATION AND  
COMPRESSION OF DATA**

**LETTER RE: PRIORITY**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

October 14, 2003


Sir:

Applicant hereby claims priority of German Application Serial No. 102 48 543.7, filed October 14, 2002. A certified copy of the priority document is enclosed.

Respectfully submitted,

DAVIDSON, DAVIDSON & KAPPEL, LLC

By

  
Robert J. Paradiso  
Reg. No. 41,240

Davidson, Davidson & Kappel, LLC  
485 Seventh Avenue, 14<sup>th</sup> Floor  
New York, New York 10018  
(212) 736-1940



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:**

102 48 543.7

**Anmeldetag:**

14. Oktober 2002

**Anmelder/Inhaber:**

Deutsche Telekom AG, Bonn/DE

**Bezeichnung:**

Verfahren zur zweidimensionalen Darstellung,  
Interpolation und zur Kompression von Daten

**IPC:**

G 06 F 17/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 4. Juni 2003  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

Weihmayr

# Verfahren zur zweidimensionalen Darstellung, Interpolation und zur Kompression von Daten

5

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft Verfahren zur mehrdimensionalen Darstellung, Interpolation und Kompression von Daten. Im Einzelnen handelt es sich um die Verwendung von zweidimensionalen Abtastfunktionen, die über den komplexen Zahlen definiert sind, um Daten effizient darzustellen, zu interpolieren, zu glätten oder zu komprimieren.

### Gebiet der Erfindung:

Im Bereich der Datenverarbeitung ist es häufig notwendig, Daten zu komprimieren, um die Übertragung zu beschleunigen oder die Verarbeitung zu verbessern. So gibt es eine Reihe von Kompressions-Algorithmen, die Interpolationsverfahren verwenden. Zu nennen sind hier bekannte Kompressionsverfahren für Bilder, wie JPEG.

### Aufgabe der Erfindung:

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren bereitzustellen, das eine effiziente Kompression von Informationen ermöglicht, wobei Interpolationsalgorithmen eingesetzt werden, die besonderen Ansprüchen genügen.

## Lösung der Aufgabe:

Diese Aufgabe wird durch die Erfindungen mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindungen sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Das Besondere der hier benutzten Verfahren ist die Verwendung von holomorphen oder meromorphen Funktionen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Fachtermini kann z. B. A. Hurwitz, Vorlesungen über allgemeine Funktionentheorie und Elliptische Funktionen, Fünfte Auflage, Springer, Berlin Heidelberg New-York, 2000, entnommen werden. Ist eine Funktion in einer offenen Teilmenge komplex differenzierbar, so heißt die Funktion auf dieser Teilmenge holomorph. Eine Funktion ist meromorph, wenn eine Funktion in einem beschränkten Gebiet in den komplexen Zahlen höchstens endlich viele Pole hat und die Funktion außerhalb dieser Pole holomorph in den komplexen Zahlen ist.

Für solche Funktionen gelten Sätze aus der Funktionentheorie, die für die zweidimensionale Signalverarbeitung und Signalkompression nutzbar gemacht werden können. In besonderer Weise gilt dies für eine auf dem Sinus Lemniskatus (siehe Gauss, Mathematisches Tagebuch 1796-1814, Harri Deutsch, 1985) beruhende zweidimensionale Abtastfunktion, deren Verhalten für Abtast- und Interpolationszwecke außergewöhnlich gut geeignet ist.

Das Verfahren ist geeignet zur Interpolation, zur Glättung und zur Kompression von Daten. Das Besondere ist die Anwendbarkeit von funktionentheoretischen Methoden, die ermöglicht wird durch Erfüllung der Cauchy-Riemannschen Bedingungen. Geeignet ist auch eine auf dem Sinus Lemniskatus beruhende Interpolationsformel, die auf der Funktion  $sl(z)/z$  beruht, wie

sie später beschrieben wird, die in den beiden Dimensionen (x-, y-Achse) identische Interpolationsfunktionen liefert.

Durch Anwendung der Cauchyschen Integralsätze und des Residuensatzes kann die neue Darstellung für die Kompression von Daten genutzt werden.

Detaillierte Beschreibung:

Ein Punkt  $P=(x,y)$ , der durch die reellen Werte  $x$  und  $y$  in kartesischen Koordinaten gegeben ist, wird zunächst als komplexe Zahl  $z=x+i*y$  dargestellt, wobei  $i$  die Quadratwurzel aus  $-1$  ist.

Es wird der Fall der äquidistanten Abtastung betrachtet, d. h. die Werte  $z_j$ , für die Abtastwerte vorliegen, liegen auf den Schnittpunkten eines Gitters. Der Einfachheit normiere man auf den Einheitsabstand und nehme als Menge der Abtastpunkte eine Teilmenge der sogenannten Gaussischen ganzen Zahlen. Die Gaussischen ganzen Zahlen sind diejenigen komplexen Zahlen, deren Real- und Imaginärteile ganze Zahlen sind. Die Werte von zweidimensionalen Funktionen  $s(z)$  an den Abtastwerten  $z_j$  sind gegeben durch  $s_j$ . Die Werte  $s_j$  gehören meist den komplexen Zahlen oder den reellen Zahlen an bzw. endlichen Approximationen dieser Zahlen, wie sie für die Informationsverarbeitung in technischen Geräten verwendet werden.

Eine wesentliche Eigenschaft der in dieser Erfindung betrachteten Funktionen  $s(z)$  ist, dass sie die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllen, außer bei ggf. vorhandenen Polstellen, d. h. sie sind holomorph oder meromorph.

Die Erfüllung dieser Gleichungen ist die Grundbedingung dafür, dass die sogenannten Cauchyschen Integralsätze bzw. der Residuensatz gelten. Zufolge dieses Satzes ist es möglich, die  
 5 Werte von  $s(z)$  innerhalb einer geschlossenen Kurve  $C$ , durch die Werte der Funktion  $s(z)$  auf dem Rand der von  $C$  begrenzten Fläche auszurechnen. Dies eröffnet eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten bei der

10 Darstellung, der Interpolation und bei der Kompression von Daten.

Zur Benutzung als Funktion  $s(z)$  sind insbesondere Funktionen geeignet, die mindestens über der Menge der Abtastpunkte  $z_j$  Nullstellen haben, außer an der Stelle  $z=0$ . Hierzu gehören zum Beispiel geeignet gewählte Polynome.

15 Im Folgenden werden die vorteilhaften Eigenschaften von  $a(z)$  zusammengefasst:

1. Es gilt  $a(z)=1$  bzw. eine andere geeignete Konstante.

2. Es gilt  $a(z_j)=0$ , wobei  $z_j \neq 0$  eine Gaussssche ganze Zahl ist.

20 3. Die Funktion ist holomorph, außer an ggf. auftretenden Polstellen.

Die Funktion  $s(z)$  wird nun dargestellt mittels

$$s(z) = \sum s_j \cdot a(z - z_j).$$

Geeignet für  $a(z)$  sind zahlreiche Funktionen, die Nullstellen mindestens an den Abtaststellen haben. Darüber hinaus ist es,  
 25 um Funktionen zu erhalten, die sich bei der Interpolation und Approximation geeignet verhalten, günstig, wenn die Untermenge der Gausssschen ganzen Zahlen, die Nullstellen der Funktion

$a(z)$  sind, sich noch über die Abtastwerte  $z_j$  hinaus mindestens bis zur Kurve  $C$  erstrecken.

Für praktische Anwendungen besonders geeignet ist eine Funktion, die mittels des Sinus Lemniskatus gebildet wird. Der Sinus Lemniskatus ist eine von Gauss eingeführte Funktion (siehe Gauss, Mathematisches Tagebuch 1796-1814, Harri Deutsch, 1985), die ähnlich der bekannten Sinusfunktion ist und sich mit Hilfe der wohlbekannten Jacobi elliptischen Funktionen darstellen lässt. Es gilt z. B.  
 $Sl(z) = (1/\sqrt{2}) \cdot sd(\sqrt{2}z, 1/\sqrt{2})$ , wobei  $sd$  z. B. mit den Standardfunktionen  $sn$  und  $dn$  wie folgt ausgedrückt werden kann:  $sd(z, k) = sn(z, k) / dn(z, k)$  (siehe etwa E.T. Whittaker, G.N. Watson, A course of modern analysis, fourth edition, Cambridge, reprinted 1969, Seite 524).

Mit dem Sinus Lemniskatus, abgekürzt  $sl(z)$ , kann man in Erweiterung der wohlbekannten eindimensionalen Abtastfunktion  $\sin(\pi x)/(\pi x)$  (siehe etwa C. Shannon, Communication in the presence of noise, Proceedings Institute of Radio Engineers, Vol. 36, 1948, pp. 10-21),  
 eine zweidimensionale Abtastfunktion

$$a(z) = \frac{sl(\bar{\pi} z)}{\bar{\pi} z}$$

bilden. Die Rolle von  $\pi$  bei der eindimensionalen Abtastfunktion übernimmt der Wert  $\bar{\pi} \approx 2.622057554$ . Die Funktion  $a(z)$  ist in Figur 1 für reelle  $z=x$  im Bereich  $-2 < x < 2$  bildlich dargestellt.

Das bemerkenswerte der Funktion  $a(z)$  ist, dass gilt  $a(iz)=a(z)$ , d. h. sie ist in der komplexen Ebene 90 Grad rotationsinvariant. Insbesondere liefert die Funktion für rein  
 5 imaginäre Werte die gleichen Werte wie für reelle Werte, hat also die für die zweidimensionale Interpolation sehr günstige Eigenschaft, dass die Abtastfunktion in beiden Dimensionen identisch ist. Dies ist eine Eigenschaft, die man bei der klassischen Abtastfunktion nicht findet, denn die klassische  
 10 Sinusfunktion lässt sich bei rein imaginären Argumenten mit der Exponentialfunktion  $\sinh$  darstellen.

Von besonderem Vorteil bei der Abtastung und Interpolation ist das sehr gutartige Verhalten von  $s(z)/z$ . Dies zeigt auch die  
 15 sogenannte Fouriertransformation.

Anhand der Fouriertransformation kann man erkennen, dass die Funktion von den Frequenzanteilen her sehr nahe am idealen Tiefpassverhalten der Funktion  $\sin(x)/x$  ist.

Nach den wohlbekannten Cauchyschen Integralsätzen können  
 20 holomorphe Funktionen innerhalb einer geschlossenen Kurve durch die Werte auf dieser Kurve bestimmt werden. In Figur 2 ist ein entsprechendes typisches Szenario abgebildet.

Die Abtastpunkte  $z_j$  sind durch kleine Kreise dargestellt. Mit Kenntnis der Funktion  $s(z)$  bei den Abtastpunkten  $z_j$ , also  
 25  $s(z_j)=s_j$  lässt sich die Funktion  $s(z)$  gemäß  $s(z)=\sum s_j \cdot a(z-z_j)$  auch auf den Punkten der Kurve  $C$  berechnen. Die Punkte auf der Kurve bezeichnet man mit der Variablen  $\tau$ .

Hat die Abtastfunktion  $a(z)$  keine Pole innerhalb von  $C$ , so gilt mit dem Cauchyschen Integralsatz für die Werte  $z$   
 30 innerhalb von  $C$ :



$$s(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{s(\tau) d\tau}{\tau - z},$$

wobei das Kurvenintegral in mathematisch positiver Richtung durchlaufen wird.

- 5 Hat die Funktion  $a(z)$  Pole, so kann durch Hinzuziehen der entsprechenden Residuen die Formel  $s(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{s(\tau) d\tau}{\tau - z}$  mittels des wohlbekannten Residuensatzes erweitert werden.

10 Wesentlich dabei ist, dass die Punkte innerhalb von  $C$  durch die Punkte  $\tau$  auf der Kurve  $C$  bestimmt werden können. Hiermit haben wir ein universelles Verfahren, um zweidimensionale Daten, aber auch allgemeine Daten, die als Werte  $s_j$  bekannt sind, durch Werte auf der Kurve  $C$  zu speichern.

15 Bei meromorphen Funktionen sind ggf. noch Residuen hinzuzuziehen. Die Weglänge auf der Kurve kann dabei z. B. zur Parametrisierung benutzt werden.

Je nach Redundanz der Daten  $s_j$  gelingt es, mit weniger Daten auf der Kurve auszukommen. Hierdurch ergibt sich der Kompressionseffekt.

20 Anhand der folgenden Figuren wird die Erfindung mittels eines Beispiels beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine zweidimensionale Abtastfunktion  $a(z) = \sin(\pi z) / (\pi z)$ ;

Fig. 2 eine geschlossene Kurve  $C$  mit Abtastpunkten innerhalb von  $C$ .

25 Fig. 3 den Realteil von  $s(z)$  auf  $C$

Fig. 4 den Imaginärteil von  $s(z)$  auf  $C_1$

Es werden die Punkte von Figur 2 betrachtet, wobei als  
Abtastwerte  $s_j(z_j)$  die Werte der Funktion  $s(z) = si(\pi x/5) \cdot si(\pi y/5)$   
5 genommen werden, wobei  $z = x + iy$  und  $si(x) = \sin(x)/x$  gilt. Die  
komplexen Abtastpunkte  $z_j$  sind die  $17 \cdot 13 = 221$  Gausssschen  
ganzen Zahlen innerhalb der Kurve  $C$ .

Die Kurve  $C$  besteht aus den vier Geradenstücken  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  und  
 $C_4$ .

10 Die Strecke  $C_1$  hat den Realteil 9 und der Imaginärteil läuft  
von  $-7$  bis  $7$ . Der Realteil von  $s(z)$  auf der Kurve  $C_1$  ist in  
Figur 3 und der Imaginärteil von  $s(z)$  in Figur 4 dargestellt.  
Der Verlauf auf den restlichen Kurvenstücken  $C_{2,3,4}$  ist ähnlich.

Anhand der Bilder erkennt man, dass die Berechnung der  
15 Umlaufintegrale im Wesentlichen eine Tiefpassfilterung ist.

## Liste der Literatur

1. Gauss, Mathematisches Tagebuch 1796-1814, Harri Deutsch, 1985.
- 5     2. C.Shannon, Communication in the presence of noise,  
      Proceedings Institute of Radio Engineers, Vol. 36, 1948,  
      pp.10-21.
- 10    3. A. Hurwitz, Vorlesungen über allgemeine Funktionentheorie  
      und Elliptische Funktionen, Fünfte Auflage, Springer,  
      Berlin Heidelberg New-York, 2000.
4. E.T.Whittaker, G.N.Watson, A course of modern analysis,  
      fourth edition, Cambridge, reprinted 1969, Seite 524.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Darstellung und/oder Interpolation  
und/oder Kompression von automatisch verarbeitbaren  
Daten, unter Verwendung einer zweidimensionalen  
Interpolationsformel  $s(z)$ , basierend auf einer  
Abtastfunktion  $a(z)$ , dadurch gekennzeichnet, dass  
für die Interpolationsformel der Cauchysche  
Integralsatz und ggf. der Residuensatz anwendbar  
sind.
2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch  
gekennzeichnet, dass  $a(z)$  eine Funktion über den  
komplexen Zahlen ist, für die gilt  $a(0)=1$  und die  
mindestens an allen anderen in Betracht kommenden  
Abtastwerten  $z_j=0$  ist.
3. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch  
gekennzeichnet, dass die Interpolationsformel  
 $s(z)=\sum s_j a(z-z_j)$  sich an den komplexen Abtaststellen  
 $z_j$  durch die Funktionswerte  $s_j$  darstellen lässt.
4. Verfahren nach einem oder mehreren der  
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,  
dass die Funktion  $a(z)$  mit Hilfe von  
doppeltperiodischen und/oder  
quasidoppeltperiodischen komplexen Funktionen  
konstruiert wird.
5. Verfahren nach einem oder mehreren der  
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,  
dass es sich bei der komplexen Funktion  $a(z)$  um eine  
Funktion handelt, die holomorph ist.

6. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass bei vorhandenen Polen die Funktion  $a(z)$  nicht holomorph ist.
- 5 7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtastwerte der Funktion  $s(z)$  im Innern einer geschlossenen Kurve  $C$  liegen.
- 10 8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Funktionswerte von  $s(z)$  für Punkte auf der Kurve  $C$  durch die Gleichung  $s(z) = \sum s_j a(z - z_j)$  bestimmt werden.
- 15 9. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionswerte auf der geschlossenen Kurve  $C$  mit Hilfe der Weglänge parametrisiert werden, sodass eine äquivalente eindimensionale Datenmenge erhalten wird.
- 20 10. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Punkte von  $s(z)$  im Innern der Kurve  $C$  mittels des Cauchyschen Integralsatzes, und bei vorhandenen Polen mit weiterer Zuhilfenahme des Residuensatzes im Innern von  $C$  mit Funktionswerten auf  $C$  bestimmt werden.
- 25 11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Interpolationsfunktion die Funktion  $a(z) = sl(\bar{\pi} z) / (\bar{\pi} z)$  benutzt wird.
- 30 12. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass  $sl(z)$  der Sinus Lemniskatus ist, eine elliptische Funktion, die sich mit Hilfe der Jacobischen elliptischen Funktionen darstellen lässt.

13. Verfahren nach einem oder mehreren der  
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,  
dass zur Kompression von Daten, die zu  
komprimierenden Daten in geeigneter Weise auf die  
Punkte im Innern der Kurve C abgebildet werden,  
insbesondere zeilenweise, um dann durch die Punkte  
auf einer zweidimensionalen geschlossenen  
Begrenzungskurve dargestellt zu werden, wobei die  
Darstellungen mittels der zweidimensionalen  
Interpolationsfunktion erhalten werden.
14. Software für einen Computer, dadurch gekennzeichnet,  
dass ein Verfahren nach einem oder mehreren der  
vorhergehenden Ansprüche implementiert ist.
15. Datenträger für einen Computer, gekennzeichnet durch  
die Speicherung einer Software nach dem  
vorhergehenden Softwareanspruch.
16. Computersystem, gekennzeichnet durch eine  
Einrichtung, die den Ablauf eines Verfahrens nach  
einem oder mehreren der vorhergehenden  
Verfahrensansprüche erlaubt.

## Verfahren zur zweidimensionalen Darstellung, Interpolation und zur Kompression von Daten

### Zusammenfassung

Das Verfahren ist geeignet zur Repräsentation, Interpolation, zur Glättung und zur Kompression von Daten. Das Besondere ist die Anwendbarkeit von funktionentheoretischen Methoden, die ermöglicht wird durch Erfüllung der Cauchy-Riemannschen Bedingungen. Geeignet ist auch eine auf dem Sinus Lemniskatus beruhende Interpolationsformel, die auf der Funktion  $sl(z)/z$  beruht, wie sie später beschrieben wird, die in den beiden Dimensionen (x-, y-Achse) identische Interpolationsfunktionen liefert.

Durch Anwendung der Cauchyschen Integralsätze kann die neue Darstellung für die Kompression von Daten genutzt werden.

(Fig. 2)




Fig. 1




Fig. 2






Fig. 3




Fig. 4




Fig. 2